


食前胃腸薬

新キヤベ2^{コーワ}

もたれやムカムカ、食欲不振といった胃のトラブルは、快適な生活をさまたげてしまう問題のひとつです。特に、ちょっと食べ過ぎてしまったり、少しの間不規則な生活が続いただけで、すぐに胃のコンディションを落としてしまう人にとって、胃の調子をよくしておくことは重大な関心事といえるでしょう。いつでも、どこにいても、食事の前には胃の機能を整えてスッキリした状態で食事ができるようにしておきたいものです。

新キヤベ2^{コーワ}は、この目的に沿って開発された食前タイプの胃腸薬で、胃の調子が悪い時、食事の前にはのみますと、弱っている胃の壁に保護膜をつくりながら事前に胃の働きをよくしておいてくれます。もたれ、ムカムカが抑えられ、また胃がスッキリしますので、食欲が出て食べられるようになります。

溶けやすい顆粒剤で携帯にも便利な2連包です。外でのお食事、出張や旅行先でもその効果を発揮して胃をやさしく整えてくれます。

 使用上の注意 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の方は服用しないでください
透析療法を受けている人。
- ② 長期連用しないでください

 相談すること

- ① 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
腎臓病
- ② 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

もたれ、胃部・腹部膨満感、胃部不快感、食欲不振、消化不良、胃弱、胃重、胃痛、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃酸過多、胸やけ、げっぷ、胸つかえ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量

下記の量を**毎食前**に水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満の小児	×服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

成分・分量(3包:3.9g中)

- 乾燥水酸化アルミニウムゲル 450.0mg
- 合成ヒドロタルサイト 450.0mg
- 水酸化マグネシウム 325.0mg
- ウイキョウ末 200.0mg
- チョウジ末 50.0mg
- ショウキョウ末 50.0mg
- ウコン末 300.0mg
- ニンジン乾燥エキス-E 20.0mg (ニンジンとして290mg)
- カンゾウエキス末 75.0mg (カンゾウとして525mg)
- メチルメチオニンスルホニウムクロリド 30.0mg
- ベンフォチアミン 25.0mg

[添加物]トウモロコシデンプン、カルメロースCa、硬化油、キシリトール、二酸化ケイ素、*l*-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限(外箱及び分包に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

- 興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14