ビタミンBı主薬製剤

キューピーコーワ コンドロイザー 0

キューピーコーワコンドロイザーαは関節・神経の働きに効果のあるビタミンB₁をはじめとした有効成分に、鎮痛・抗炎症作用のある生薬ボウイ、関節軟骨の構成成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合し"今ある痛み"に働きかけ、ツラいひざなどの関節痛・神経痛に効果をあらわしていきます。

特長

- ●鎮痛・抗炎症作用のある生薬ボウイを配合し、 痛みや炎症を抑え、ツラいひざなどの関節痛・ 神経痛などを緩和します。
- キズついた末梢神経に働きかける活性型 ビタミンB12(メコバラミン)を配合しています。
- 食前・食後にかかわらず、1日2回の服用で 効果を発揮します。
- のみやすいフィルムコーティング設計の錠剤です。



⚠ 使用上の注意

Negal Republican

相談すること

- ●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ❷服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |

- ❸服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください軟便、下痢
- ◆1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

効能・効果

1. 次の諸症状の緩和:

関節痛・筋肉痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 (慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)

2. 脚気

「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

3. 次の場合のビタミンB₁の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|-----------|--------|
| 成人(15歳以上) | 3錠 🔾 🔾 🔾 | 2回 |
| 15歳未満の小児 | ➤ 服用しないこと | |

●食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。


| ᅷᇧ | 八旦 | へ合きよい |
|----|------|--------------|
| 成分 | ・分量(| の延出 |

| 成分・分量 | 働き |
|---|--|
| ボウイ乾燥エキス 240.0mg (防已として 3000mg) | 大葛藤(オオツヅラフジ)の茎及び根茎から 抽出された成分で、痛みや炎症を抑える作用 があり、関節痛・神経痛などを緩和します。 |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 900.0mg | 関節軟骨の構成成分のひとつです。 |
| ベンフォチアミン 13.83mg 〔チアミン塩化物塩酸塩(V.B ₁)として 10.0mg〕 | からだに取り込まれやすくした活性ビタミン B1で、関節痛・神経痛などを緩和します。 |
| メコバラミン(V.B ₁₂) 60.0μg | キズついた末梢神経に働きかけます。 |
| ガンマ-オリザノ―ル 10.0mg | 神経を調整し、関節痛を緩和します。 |

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- ●高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して、外箱に入れて保管してください。(光によって品質に影響を与える場合があります。)
- ❷小児の手の届かない所に保管してください。
- ❸他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ⑤容器の中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてある もので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- ⑥容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- ❸使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。





お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566 受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00



●興和製品サイト https://hc.kowa.co.jp/otc





